

Q

これまでに認められている副反応にはどのようなものがありますか。

A

注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み等がみられることがあります。まれな頻度でアナフィラキシー（急性のアレルギー反応）が発生します。

ファイザー社の新型コロナワクチンでは、接種後に注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱等がみられることがあります。こうした症状の大部分は、接種後数日以内に回復しています。

（承認前の臨床試験でのこうした症状の頻度は

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_pfizer.html、接種開始後の健康状況調査の結果は https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkoujoukyoutyousa.html）

発現割合	症状
50% 以上	接種部位の痛み、疲労、頭痛
10%～50%	筋肉痛、悪寒、関節痛、下痢、発熱、接種部位の腫れ
1%～10%	吐き気、嘔吐

コミナティ®(ファイザー社)添付文書より改編



日本への供給が計画されている海外のワクチン（アストラゼネカ社、モデルナ社、ノババックス社が開発中のワクチン）でも、ワクチン接種後に、ワクチン接種と因果関係がないものも含めて、接種部位の痛みや、頭痛・倦怠感・筋肉痛等の症状がみられたことが論文等に発表されています。（詳細は、副反応に関する審議会資料 <https://www.mhlw.go.jp/content/10601000/000710377.pdf> をご覧ください。）

また、稀な頻度でアナフィラキシー（急性のアレルギー反応）が発生したことが報告されています。アナフィラキシーの報告状況等は、

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_hukuhannou-utagai-houkoku.html#001 に掲載しています。もし、アナフィラキシーが起きたときには、接種会場や医療機関ですぐに治療を行うことになります。



出典

厚生労働省ホームページ「新型コロナワクチン Q&A」
<https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/>